

本说明书内容翻译自面向日本国内顾客的产品信息，内容仅供参考，详细信息请参照产品说明书

2013年6月修订

使用前请一定仔细阅读说明书，并妥善保管，以便查阅之需

第2类医药品

防己黄芪汤浸膏片「东亚」

本药是由「防己黄芪汤」提取的浸膏制成的免煎片剂。适用于皮肤苍白，肌肉松弛，易疲倦，有易出汗倾向的肥胖症，关节肿痛等症状。

注意事项

《请咨询》

- 符合下列情况时，用药前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 - 正在接受医师治疗的人
 - 孕妇或可能怀孕的人
 - 曾有使用药物后出现皮疹·发红或瘙痒等症状的人
- 下述用药后症状提示可能出现药物不良反应。应立即停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹·发红，瘙痒
消化系统	食欲不振，胃部不适

偶见下列严重症状，一旦出现请立即就医。

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯等运动稍有过量即出现气急，喘憋，干咳，发热等。上述症状可以是突然发生，亦可呈持续发作
肝功能障碍	出现发热，瘙痒，皮疹，黄疸（皮肤和巩膜发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

- 用药约1个月后症状未有缓解时，停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能·主治]

用于中等以下体力的人，伴有易疲倦并易出汗倾向的下列诸症：

肥胖伴关节肿痛，浮肿，多汗症，肥胖症（肌肉松弛，即所谓的虚胖）

[用法・用量]

餐前或餐间服用，用凉水或温开水送服，用量如下：

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	3 次
7 岁以上 未满 15 岁	3 片	
5 岁以上 未满 7 岁	2 片	
未满 5 岁	请勿服用	

餐间服用：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法・用量的注意]

5 岁以上的儿童用药时，必须在家长监护下进行。

[成份・规格]

1 日剂量 12 片（每片重 320mg）中包含：

防己黄芪汤浸膏 1.90g

由防己 2.50g，黄芪 2.50g，白术 1.50g，大枣 1.50g，甘草 0.75g，生姜 0.50g 制成的干燥浸膏

辅料：含有乳糖，纤维素，CMC-Ca（羧甲基纤维素钙），硬脂酸镁

[储藏与使用注意事项]

1. 请存放在避免直接日晒的阴凉干燥处，密封储藏。
2. 存放处应避免儿童接触。
3. 请勿置于其他容器内（以免误用，防止变质）
4. 本药是用天然中药材（药用的根，茎，叶，皮）制成的制剂，所以片剂的颜色可因产品而稍有不同。但不会影响其药效。
5. 请勿使用超过保质期的产品。

生产销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55