

本说明书内容翻译自面向日本国内顾客的产品信息，内容仅供参考，详细信息请参照产品说明书

使用前请一定仔细阅读说明书，并妥善保管，以便查阅之需

第2类医药品

防风通圣散料浸膏片「至圣」

防风通圣散料浸膏片「至圣」是满量处方的成人1日剂量中浸膏有效成分达6000mg的防风通圣散制剂。本药适用于由不规律生活习惯等原因导致腹部皮下脂肪堆积，便秘倾向人群的浮肿，便秘和肥胖症等。

注意事项

《禁忌事项》

违反禁忌事项可使现有病情恶化，且易发生不良反应

1. 服用本药期间，请勿服用下列药品

其他泻药

2. 哺乳期请勿服用本药，或服用本药时请勿哺乳。

《请咨询》

1. 符合下列情况时，用药前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

(1) 正在接受医师治疗的人

(2) 孕妇或可能怀孕的人

(3) 身体虚弱的人（体衰，体弱）

(4) 肠胃虚弱的人，容易腹泻的人

(5) 有显著的出汗倾向的人

(6) 老年人

(7) 曾有使用药物等后出现皮疹・发红或瘙痒等症状的人

(8) 有下列症状的人

浮肿，排尿困难

(9) 诊断为下列疾病的人

高血压，心脏病，肾脏病，甲状腺功能障碍

2. 下述用药后症状提示可能出现药物不良反应。应立即停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

| 部位 | 症状 |
|------|---------------------|
| 皮肤 | 皮疹・发红，瘙痒 |
| 消化系统 | 恶心・呕吐，食欲不振，胃部不适，腹部膨 |

| | |
|--------|----------------|
| | 胀，伴有剧烈腹痛的腹泻，腹痛 |
| 精神神经系统 | 眩晕 |
| 其他 | 出汗，心悸，浮肿，头痛 |

偶见下列严重症状，一旦出现请立即就医。

| 症状名称 | 症状 |
|-------------|---|
| 间质性肺炎 | 上楼梯等运动稍有过量即出现气急，喘憋，干咳，发热等。上述症状可以是突然发生，亦可呈持续发作 |
| 假性醛固酮增多症，肌病 | 出现四肢酸软，发麻，僵直，僵硬感之外，伴发进行性加重的无力感，肌肉疼痛 |
| 肝功能障碍 | 出现发热，瘙痒，皮疹，黄疸（皮肤和巩膜发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等 |

3. 服用后可能出现下列症状，若该症状持续不缓解或加重时，应停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

腹泻，便秘

4. 用药约 1 个月后（用于便秘时用药约 1 周后）症状未有缓解时，停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

5. 长期连续服用时，应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能·主治]

用于体力充实的人，伴有腹部有多余皮下脂肪，有便秘倾向的下列诸症：

高血压，肥胖伴心悸·肩膀僵硬·上火·浮肿·便秘·慢性鼻窦炎（鼻窦炎）·湿疹·皮肤炎，疖子（粉刺），肥胖症

[用法·用量]

餐前或餐间服用，用温开水或凉水送服，用量如下：

| 年龄 | 单次剂量 | 每日服用次数 |
|---------------|------|--------|
| 成人（15 岁以上） | 6 片 | 3 次 |
| 7 岁以上 未满 15 岁 | 3 片 | |
| 5 岁以上 未满 7 岁 | 2 片 | |
| 未满 5 岁 | 请勿服用 | |

餐间服用：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法·用量的注意事项]

5 岁以上的儿童用药时，必须在家长监护下进行。

[成份・规格]

1 日剂量 18 片中包含:

防风通圣散料浸膏 6.0g

由当归 1.20g, 芍药 1.20g, 川芎 1.20g, 山栀子 1.20g, 连翘 1.20g, 薄荷 1.20g, 生姜 0.40g, 荆芥 1.20g, 防风 1.20g, 麻黄 1.20g, 大黄 1.50g, 芒硝 1.50g, 白术 2.00g, 桔梗 2.00g, 黄芩 2.00g, 甘草 2.00g, 石膏 2.00g, 滑石 3.00g 制成的干燥浸膏

辅料: 含有海藻糖, 硅酸铝镁, 羟丙纤维素, 硬脂酸镁

本药是用天然中药材制成的制剂, 所以片剂的颜色可因产品而稍有不同。

[储藏与使用注意事项]

1. 请存放在避免直接日晒的阴凉干燥处, 密封储藏。
2. 存放处应避免儿童接触。
3. 请勿置于其他容器内 (以免误用, 防止变质)
4. 因本药易受潮, 每次用完后请盖好瓶盖。
5. 请不要用湿手触摸本药。(片剂接触水分会发生变色)

生产销售商 北日本制药株式会社
富山县中新川郡上市町若杉 55