

本说明书内容翻译自面向日本国内顾客的产品信息，内容仅供参考，详细信息请参照产品说明书

使用前请一定仔细阅读说明书，并妥善保管，以便查阅之需

## 第2类医药品

# 葛根汤浸膏颗粒 SKT

葛根汤浸膏颗粒 SKT 是代表性汉方药「葛根汤」的免煎颗粒剂。本药适用于感冒初期的头痛，鼻炎，恶寒等症状，且服用后无困倦嗜睡等不良反应。此外本药亦能缓解肩膀僵硬，肌肉疼痛，长期操作电脑等电子产品后所致的手臂与肩膀的酸痛感。

### 注意事项

#### 《禁忌事项》

符合下列情况时，请勿服用

出生后未满3个月的婴儿

#### 《请咨询》

1. 符合下列情况时，用药前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医师治疗的人
- (2) 孕妇或可能怀孕的人
- (3) 身体虚弱的人（体衰，体弱）
- (4) 肠胃虚弱的人
- (5) 有显著的出汗倾向的人
- (6) 老年人
- (7) 曾有使用药物后出现皮疹・发红或瘙痒等症状的人
- (8) 有下列症状的人  
    浮肿，排尿困难
- (9) 诊断为下列疾病的人  
    高血压，心脏病，肾脏病，甲状腺功能障碍

2. 下述用药后症状提示可能出现药物不良反应。应立即停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

部位	症状
皮肤	皮疹・发红，瘙痒
消化系统	恶心，食欲不振，胃部不适

偶见下列严重症状，一旦出现请立即就医。

症状名称	症状
------	----

假性醛固酮增多症，肌病	出现四肢酸软，发麻，僵直，僵硬感之外，伴发进行性加重的无力感，肌肉疼痛
肝功能障碍	出现发热，瘙痒，皮疹，黄疸（皮肤和巩膜发黄），褐色尿，全身酸软，食欲不振等

3. 用药约 1 个月后（用于感冒初期，鼻炎，头痛时用药 5~6 次后）症状未有缓解时，停药并携带本药说明书咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

4. 长期连续服用时，应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。

[功能·主治]

用于中等体力以上的人的下列诸症：

感冒初期（未见出汗），急性鼻炎，鼻炎，头痛，肩膀僵硬，肌肉疼痛，手臂·肩膀疼痛

[用法·用量]

餐前或餐间服用，用凉水或温开水送服，用量如下：

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15 岁以上）	1 袋	3 次
7 岁以上 未满 15 岁	2/3 袋	
4 岁以上 未满 7 岁	1/2 袋	
2 岁以上 未满 4 岁	1/3 袋	
未满 2 岁	1/4 袋	

餐间服用：即在两餐之间，上次饭后 2-3 小时后服用。

[关于用法·用量的注意事项]

- 2 岁以上儿童用药时，必须在家长监护下进行。
- 未满 1 岁的婴儿应当优先接受医师诊疗，只在不得已的情况下才可以给婴儿使用。
- 应遵守用法·用量

[成份·规格]

1 日剂量 3 袋（1 袋装 2.25g）中包含：

葛根汤浸膏（3/4 量）3.75g

由葛根 6g，麻黄 3g，大枣 3g，桂皮 2.25g，芍药 2.25g，甘草 1.5g，生姜 0.75g 制成的干燥浸膏

辅料：含有白糖，乳糖，D-甘露糖，蔗糖脂肪酸酯

[储藏与使用注意事项]

- 请储藏在避免直接日晒的阴凉干燥处。

2. 存放处应避免儿童接触。
3. 请勿置于其他容器内（以免误用，防止变质）
4. 1 袋药品分次服用时，请将剩余药品的袋口折叠 2 次后保存，并在 2 日内用完。

生产销售商 北日本制药株式会社  
富山县中新川郡上市町若杉 55